

# ESTENOSIS TRAQUEAL NO NEOPLÁSICA: UN PROBLEMA EMERGENTE

OVIEDO VILLALBA J.\*, TALAVERA RAMÍREZ M., CHAPARRO ABENTE G., MENDOZA TORRES C.,  
PÉREZ BEJARANO D. INERAM "PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER", PARAGUAY.

**Introducción:** La estenosis traqueal no neoplásica (ETNN) se describe como una patología poco frecuente; sin embargo, hemos notado un aumento sostenido importante de esta patología.

**Objetivo:** Resaltar la principal causa de estenosis traqueal potencialmente previsible.

**Material y Método:** Estudio observacional – descriptivo con componente analítico de informes de la Unidad de Endoscopía Respiratoria de nuestro Instituto, (1994 – 2004).

**Resultados:** De 52 registros de ETNN sobresalieron antecedentes de ARM en 46.1%, tuberculosis 11.5%, paracoccidiodomicosis 9.6%, causas diferentes (traqueostomía, arma de fuego, accidente de tránsito) 11.5% y no especificadas 15.3%. Recibieron traqueotomía 9.6%. En cuanto al tipo, 19 fueron no membranosas y sólo 1 se describió como membranosa al examen endoscópico. Se visualizaron granulomas en 28.8% de las estenosis. Considerando la localización se observaron 25% en subglotis y 75% por debajo de ese nivel; en 1 caso se observó estenosis subglótica y traqueal extensa. En 9.6% se encontraron asociaciones a traqueomalacia. Fueron sometidos a dilatación simple con broncoscopio rígido 23% de los pacientes, dilatación con electrofulguración 19.2%, se colocó algún tipo de dilatador (prótesis de Dumont, Montgomery, Freytag) en el 19.2%. 76.9% fueron masculinos y 23.1% femeninos, la edad promedio fue de 30,16 años.

**Conclusión:** Considerando el aumento progresivo de los casos y resaltando el hecho de que la mayoría de estas estenosis tienen como antecedente el haber recibido intubación oro traqueal, creemos que estamos ante "un problema emergente de salud". Son necesarios programas de entrenamiento en manejo de vía aérea central de emergencia, en casos que requieran ARM, así como también la implementación de protocolos estandarizados y control en el ámbito nacional.

*Presentado en el VIII Congreso Paraguayo de Medicina Interna, 2006*